Rooting®

Boletín técnico

DIFERENCIADORES

- Única tecnología diseñada para plantas establecidas.
- Alta capacidad de arranque.
- Amplio rango de seguridad que no genera residualidad.
- Uso y funcionamiento según situación.
- Efecto incremental según dosis.
- La mayor horizontalidad tanto en cultivos como en condiciones de suelo.

Agroenzymas® MX

Hacer de tus sueños una historia de éxito.

Rooting® Es una herramienta que está diseñada sobre una plataforma tecnologíca basada en marcadores y carriers exógenos que estimulan formación de nuevas raíces en plantas establecidas.

RECOMENDACIONES

CULTIVOS	DOSIS L/ha	ÉPOCA DE APLICACIÓN
Vid	1 - 3	Aplicación al suelo en banda bajo la hilera con 500-600 L de agua. Puede ser aplicado vía el sistema de riego por goteo.
Frutales caducifolios y perennifolios	1 - 5	Aplicar al suelo en banda en la línea de copa del árbol, utilice un volumen de agua que permita una penetración adecuada.
Cebolla	1,0	Al momento del trasplante aplique a la base del cuello.
Limón	1 - 3	Aplicar al suelo en banda en la línea de copa del árbol, utilice un volumen de agua que permita una penetración adecuada.
Chile y tomate	1,0	Dirija la aplicación a la base de la planta o aplicar por sistema de riego presurizado.
Ajo	0,5	Aplique con 2 hojas verdaderas dirigiendo la aplicación a la base de la planta.
Melón y sandía	0,5	Dirija la aplicación a la base de la planta o aplicar por sistema de riego presurizado.
Guayaba	0,5 - 2	En árboles mayores a tres años aplique la dosis alta y la baja en árboles con menos de tres años.
Ornamentales	1 -2	Después de trasplantar cuando prenda aplique a la base del cuello.
Nogal	1 - 2	Se puede asperjar en suelo y regar inmediatamente. Inyectar a 20 cm de profundidad con 600 L de agua en doble línea entre árboles.
Rosa	1 - 3	Aplique mediante el sistema de riego 15 días después de una cosecha fuerte.
Frambuesa	1 - 1,5	Utilice la dosis alta en riego rodado y la baja en presurizado. Aplique en el vivero, al prendimiento después del trasplante, en crecimiento vegetativo y una poda.
Fresa	1,0	Aplique al vivero, después del transplante y al terminar la tercera floración.
Papa	1,0	Aplique al fondo del surco al momento de la siembra.
Banana y plátano	2 - 3	Cada tres meses después del deshije.
Caña	1 - 2	Aplique cuando inicie la formación de raíces. Generalmente varía desde 45 a 80 días después del corte.