



DIFERENCIADORES



En un manejo integral reduce costos para obtener tamaño de baya.



No afecta la fructibilidad.



No degrada la capa cerosa ni cutícula.



Fortalece los tejidos.



Efecto localizado.

CREZYMAX[®]-L

Es una herramienta que optimiza el tamaño de baya sin causar efecto negativo en etapas fenológicas posteriores.

RECOMENDACIONES Puede utilizarse en dos sistemas de aplicación

TABLA 1















| VARIEDAD | DOSIS (mL/L agua) | ÉPOCA DE APLICACIÓN (mm Diámetro de baya) |
|---|----------------------|--|
|  Perlette | 2,5 | 4 - 8 |
|  Flame Seedless | 2,5 | 6 - 9 |
|  Superior | 1,5 | 6 - 9 |
|  Thompson Seedless | 1,5 | 5 - 7 |
|  Red Globe | 1,5 | 10 - 12 |
|  Crimson Seedless | 1,5 | 8 - 10 |
|  Auttum Royal | 1,5 | 6 - 10 |

TABLA 2

| VARIEDAD | CREZYMAL® L Giberélico | ÉPOCA DE APLICACIÓN |
|--|---------------------------|---|
|  Perlette | 50 cc / 100 L | 2ª o 3ª aplicación de Giberélico tamaño |
|  Flame Seedless | 50 cc / 100 L | 2ª o 3ª aplicación de Giberélico tamaño |
|  Superior (Sugraño) | 25 cc / 100 L | 2ª o 3ª aplicación de Giberélico tamaño |
|  Thompson Seedless | 25 cc / 100 L | 2ª o 3ª aplicación de Giberélico tamaño |
|  Red Globe | 25 cc / 100 L | 2ª o 3ª aplicación de Giberélico tamaño |
|  Crimson Seedless | 25 cc / 100 L | 2ª o 3ª aplicación de Giberélico tamaño |
|  Auttum Royal | 25 cc / 100 L | 2ª o 3ª aplicación de Giberélico tamaño |