



Boletín técnico DIFERENCIADORES



Multi etapas.



Cuenta con macronutrientos.



Fortalecido con microelementos quelatados.



Formulación con ácidos húmicos.

FERTILIZANTE INORGÁNICO

AGROMAX[®]

FERTILIZANTE INORGÁNICO

AGROMAX®

Es una herramienta nutrimental multi etapas que cuenta con micro y macroelementos.

RECOMENDACIONES

CULTIVOS	DOSIS /ha	ÉPOCA DE APLICACIÓN
 Alfalfa	3 L/ ha	10 días después de cada corte.
 Algodón	3 L/ ha	1a. Aplicación al cuadro. 2a. Aplicación 15 días después. 3a. Quince días después de la 2a.
 Arroz y avena	3 L/ ha	1a. Aplicación al encañe. 2a. Al embuche. 3a. A la floración.
 Chile	3 L/ ha	1a. A la floración. 2a. Quince días después. 3a. Quince días después de la 2a.
 Frijol	3 L/ ha	1a. Aplicación a la floración. 2a. Quince días después.
 Manzana	3 L/ ha	1a. Aplicación después de raleo. 2a. Veinte días después. 3a. Veinte días después de la 2a.
 Melón	3 L/ ha	1a. Aplicación a la floración. 2a. Quince días después. 3a. Quince días después de la 2a.
 Pepino	3 L/ ha	1a. Aplicación a la floración. 2a. Quince días después. 3a. Quince días después de la 2a.
 Sandía	2,5 L/ ha	1a. Aplicación a la floración. 2a. Quince días después. 3a. Diez días después de la 2a.
 Soya	3 L/ ha	1a. Aplicación a la floración. 2a. Aplicación 15 días después.
 Tomate	3 L/ ha	1a. Aplicación a la floración. Repita quincenalmente.
 Trigo	2,5 L/ ha	1a. Aplicación al embuche. 2a. A la floración.
 Vid	3 L/ ha	1a. Aplicación a la floración. 2a. Quince días después. 3a. Quince días después de la 2a.